



IMAGEN MÉDICA

PERICONDRITIS POSTERIOR A COLOCACIÓN DE PIERCING

Raúl Andrés Tornaco Maidana, Santiago Vallejos Riart, Julio Ernesto Gonzalez Saldivar

Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Asunción, Paraguay.

Paciente acude a consulta por tumefacción dolorosa de pabellón auricular derecho, refiere como antecedente la colocación de piercing en pabellón auricular derecho en el canal del hélix 5 días previos al cuadro.

Al momento de la evaluación se constata dicha tumefacción, la cual se punza, con debito de secreción purulenta la cual se envía a cultivo, se realiza incisión de drenaje, se realizan dos puntos colchoneros con vycril 3.0 y se cubre con ciprofloxacina oral y analgesia.

El resultado del cultivo fue *Pseudomonas aureginosa* sensible a ciprofloxacina.

Autor de correspondencia:

Raúl Andrés Tornaco Maidana
raultornaco@gmail.com

Recibido: 01/03/2020

Aceptado: 05/05/2020

Financiamiento:

Autofinanciado

Conflictos de interés:

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Figura 1. Lesión previo al drenaje.



Figura 2. Estado de la lesión en el quinto día post drenaje.

